Construisez votre cartes d'identité nature pliez sur les pointillés 1 collez les pages (effet recto-verso) puis découpez sur les traitillés 2.

RANDONATURE.CH

Guide des batraciens de Suisse romande

Crapaud accoucheur ou alyte (Alytes obstetricans)

Famille: Discoglossidae

Répartition: Souvent dans les gravières, dans toute la Suisse romande jusqu'à 1650m d'altitude.

Description: Petit crapaud discret à dos verruqueux de couleur brun-gris tachetée de gris de brun ou de vert. Son ventre est blanc sale. Sa tête présente quelques caractéristiques permettant de l'identifier: yeux saillants, pupilles à fente verticale et glandes parotoïdes peu développées.

Les adultes peuvent mesurer jusqu'à 5 cm.

Différenciation des sexes: Il est difficile de distinguer les mâles des femelles. Cependant, le mâle est un petit peu plus petit et il porte les oeufs sur son dos durant leur maturation.

Habitats: -Hibernation: de octobre à mars . Les adultes hibernent dans le sol, les larves dans des plans d'eau généralement stagnants.

-Reproduction: de mars à juillet , jusqu'en septembre pour certains individus. L'accouplement se fait sur terre dans des zones bien ensoleillées et humides présentant de nombreuses cachettes (gravières, carrières, zones alluviales,...).

-Estivage: de juillet à octobre sur la terre dans le même type de milieu. Etant donné la grande variété d'altitudes auxquelles vivent les crapauds accoucheurs, les périodes indiquées ci-dessus peuvent varier.

Confusions: Aucune confusion possible

Protection: Cette espèce est menacée à long terme.Comme pour tous les autres amphibiens de Suisse, il est interdit de les capturer, de les tuer ou de les déplacer, même dans le cas ou vous souhaitez aménager un étang et y avoir des batraciens.

Copyright Randonature

A savoir: Le crapaud accoucheur est appelé ainsi car, contrairement aux autres espèces, le mâle porte les oeufs sur son dos pendant leur maturation. Il les attache à ses pattes arrières par un filamant, puis les dépose avant l'éclosion dans un plan d'eau généralement stagnante.Cette espèce hiberne souvent sous forme de larve.